

Notations

Si A est une matrice de $M_n(K)$, $\text{Tr}A$ désigne la trace de A . On pourra utiliser, sans démonstration, le résultat suivant : si A est une matrice de $M_{n,p}(K)$ et B une matrice de $M_{p,n}(K)$, on a $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.

Le problème porte sur des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients réels ou complexes. L'ensemble de ces matrices sera noté $M_2(K)$, où K désignera selon le cas, le corps \mathbb{R} ou le corps \mathbb{C} . On notera E la matrice unité :

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

et on désignera par \mathcal{B} la base canonique de $M_2(K)$, constituée des matrices suivantes :

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

On notera \mathcal{D} l'ensemble des matrices scalaires, c'est-à-dire celles de la forme aE , avec a appartenant à K .

On notera $s(A)$ "la matrice complémentaire" de la matrice A , qui est par définition la transposée de la matrice des cofacteurs de A .

Les espaces vectoriels \mathbb{R}^n seront identifiés aux espaces de matrices colonnes $M_{n,1}(\mathbb{R})$; ces espaces seront munis de leur structure euclidienne canonique pour laquelle le produit scalaire des vecteurs X et Y est donné par tXY ; la norme associée sera notée $\|X\|$.

Lorsque le corps de base est \mathbb{R} , on notera \mathcal{A} l'ensemble des matrices antisymétriques, \mathcal{S} celui des matrices symétriques, et \mathcal{O} celui des matrices orthogonales. On désignera enfin par \mathcal{S}^+ l'ensemble des matrices symétriques positives, c'est-à-dire l'ensemble des matrices A de \mathcal{S} qui vérifient ${}^tXAX \geq 0$ quel que soit X dans \mathbb{R}^2 .

Partie I -

Dans cette partie, on suppose que le corps de base K est \mathbb{R} ou \mathbb{C} . On notera \mathcal{M} l'ensemble $M_2(K)$.

I.A -

I.A.1) Montrer que s est un endomorphisme de \mathcal{M} ; donner la matrice de s dans la base \mathcal{B} de \mathcal{M} . Montrer que les matrices suivantes constituent une base de \mathcal{M} :

$$E = B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, B_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Donner la matrice de s dans cette base. Déterminer $s \circ s$.

I.A.2) Montrer que $s(MN) = s(N)s(M)$. Comparer, lorsque cela est possible, $s(M^{-1})$ et $(s(M))^{-1}$.

I.A.3) Pour A appartenant à \mathcal{M} établir la relation $s(A) = -A + \text{Tr}(A)E$. Montrer que si A est semblable à B , alors $s(A)$ est semblable à $s(B)$.

I.B - On désigne par \mathcal{M} l'ensemble des matrices A de M dont la trace est nulle. Montrer que \mathcal{N} est un sous-espace vectoriel de M et préciser sa dimension. Montrer que \mathcal{N} et \mathcal{D} sont des sous-espaces supplémentaires de M .

Partie II -

Dans cette partie, le corps de base est \mathbb{R} et M désigne $M_2(\mathbb{R})$.

II.A -

II.A.1) Pour M et N dans M on pose $\langle M|N \rangle = \text{Tr}(M^t N)$. Montrer que cela définit un produit scalaire sur M et donner l'expression de la norme associée.

II.A.2) Montrer que les sous-espaces \mathcal{N} et \mathcal{D} , considérés dans la première partie, sont orthogonaux pour ce produit scalaire. Montrer qu'il en est de même pour les sous-espaces \mathcal{A} et \mathcal{S} .

II.A.3) Montrer que pour tout A dans M et pour tout X et Y dans \mathbb{R}^2 , on a $\langle A|X^t Y \rangle = {}^t X A Y$.

II.B - Soient X et Y deux vecteurs de \mathbb{R}^2 formant une base orthonormée de cet espace, et α un réel. On définit les matrices P et $Q(\alpha)$ de M par : $P = E - 2X^t X$ et $Q(\alpha) = E - 2\sin^2 \alpha (X^t X + Y^t Y) + \sin(2\alpha)(X^t Y - Y^t X)$.

II.B.1) Montrer que ${}^t Q(\alpha) = Q(-\alpha)$.

II.B.2) Montrer que P et $Q(\alpha)$ sont des matrices orthogonales.

II.C - Soit A une matrice de M telle que, quelle que soit la matrice Ω de \mathcal{O} , on ait : $\langle A|\Omega - E \rangle \leq 0$. Montrer que $A \in \mathcal{S}^+$. Suggestion : calculer $\langle A|P - E \rangle$ et $\langle A|Q(\alpha) - E \rangle$ en utilisant la question II.A.3.

II.D - Dans toute la question, Ω est un élément de \mathcal{O} .

II.D.1) Montrer que $\Omega + {}^t \Omega - 2E = -(\Omega - E)^t (\Omega - E)$.

II.D.2) Soit A appartenant à \mathcal{S}^+ , et C appartenant à M . Montrer que les valeurs propres de A sont positives ou nulles et montrer que ${}^t C A C$ appartient à \mathcal{S}^+ .

II.D.3) Soit $M \in M$; montrer qu'il existe un unique couple (U, V) avec U dans \mathcal{S} et V dans \mathcal{A} tel que $M = U + V$; déterminer U et V en fonction de M .

II.D.4) Pour A dans \mathcal{S}^+ montrer que $2\langle A|\Omega - E \rangle = -\text{Tr}({}^t (\Omega - E) A (\Omega - E))$ et en déduire que, quelle que soit Ω orthogonale, $\langle A|\Omega - E \rangle \leq 0$.

II.E -

II.E.1) Soit A appartenant à \mathcal{S}^+ . Montrer qu'il existe B dans \mathcal{S}^+ telle que $A = B^2$. On pourra pour cela diagonaliser A .

II.E.2) Montrer que les trois assertions suivantes sont équivalentes pour A dans \mathcal{S}^+ et Ω orthogonale : $\Omega A = A$; $A \Omega = A$; $\langle A|\Omega - E \rangle = 0$.

II.E.3) Montrer que, quelles que soient les matrices A dans \mathcal{S}^+ et Ω dans \mathcal{O} , on a $\text{Tr}(A \Omega) \leq \text{Tr}(A)$. Quand a-t-on égalité ?

Partie III -

Dans toute cette partie, les matrices considérées sont dans $M_2(\mathbb{C})$ que l'on considère comme \mathbb{R} -espace vectoriel, et on définit le sous-ensemble \mathcal{H} de $M_2(\mathbb{C})$ dont les éléments sont de la forme

$$\begin{bmatrix} u & -\bar{v} \\ v & \bar{u} \end{bmatrix}$$

où u et v sont quelconques dans \mathbb{C} .

III.A -

III.A.1) Montrer que \mathcal{H} est un \mathbb{R} -espace vectoriel ; on considère les matrices

$$I = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, J = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}, K = \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}.$$

Vérifier que (E, I, J, K) est une base de \mathcal{H} .

III.A.2) Montrer que toute matrice non nulle de \mathcal{H} est inversible, et que son inverse est dans \mathcal{H} .

III.A.3) Pour A et B dans \mathcal{H} on pose

$$\beta(A, B) = \frac{1}{4} \text{Tr}(As(B) + Bs(A)).$$

Montrer que

$$\beta(A, B) = \frac{1}{2} (\text{Tr}(A)\text{Tr}(B) - \text{Tr}(AB)) \text{ et que } \det(A) = \beta(A, A).$$

Indication : on pourra utiliser la question I.A.3.

III.A.4) Montrer que β définit un produit scalaire sur \mathcal{H} ; si on note N la norme associée, donner l'expression de $N(A)$ et justifier que $N(A)^2 E = As(A)$.

III.B - On considère le sous-ensemble \mathcal{P} de \mathcal{H} formé des matrices de trace nulle. Montrer que \mathcal{P} est un sous-espace vectoriel de \mathcal{H} ; donner sa dimension. Montrer que tout élément A de \mathcal{H} s'écrit de façon unique sous la forme $aE + p(A)$ avec a réel et $p(A)$ dans \mathcal{P} . Quelle est alors la valeur de $s(A)$?

III.C - Pour un vecteur $X = (x, y, z)$ de \mathbb{R}^3 on définit

$$\theta(X) = \begin{bmatrix} -iz & -x + iy \\ x + iy & iz \end{bmatrix}.$$

III.C.1) Montrer que θ est un isomorphisme d'espaces vectoriels de \mathbb{R}^3 sur \mathcal{P} , et que tout élément de \mathcal{H} s'écrit de façon unique sous la forme $aE + \theta(X)$, avec a dans \mathbb{R} et X dans \mathbb{R}^3 .

III.C.2) Montrer que $\theta(X)\theta(Y) = (-{}^tXY)E + \theta(X \wedge Y)$. En déduire l'expression générale du produit $(aE + \theta(X))(bE + \theta(Y))$.

III.C.3) Soit A un élément de \mathcal{H} , $A \neq 0$. Montrer que A est dans \mathcal{P} si et seulement si $A^2 = \alpha E$ avec $\alpha < 0$. Montrer que $N(\theta(X)) = \|X\|$.

III.C.4) On appelle centre de \mathcal{H} , l'ensemble des éléments de \mathcal{H} commutant, pour le produit, avec tout élément de \mathcal{H} :

$$\text{centre}(\mathcal{H}) = \{A \in \mathcal{H} \mid \forall H \in \mathcal{H}, AH=HA\}.$$

Déterminer le centre de \mathcal{H} .

Partie IV -

On conserve dans cette partie les conventions et notations de la troisième partie ; en particulier \mathcal{H} est considéré comme un \mathbb{R} -espace vectoriel. Pour A dans \mathcal{H} , A non nul on considère l'application τ_A définie sur \mathcal{H} par $\tau_A(M) = AMA^{-1}$.

IV.A -

IV.A.1) Montrer que τ_A est un automorphisme de \mathcal{H} et que

$$\tau_A(M) = \frac{1}{N(A)^2} AMs(A).$$

IV.A.2) Montrer que si λ appartient à \mathbb{R}^* on a $\tau_A = \tau_{\lambda A}$.

IV.A.3) Montrer que si $\tau_A = \tau_B$, alors il existe $\lambda \neq 0$ tel que $A = \lambda B$.

IV.B -

IV.B.1) Montrer que le sous espace \mathcal{P} est stable par τ_A .

IV.B.2) En déduire que τ_A permet de définir une application linéaire ρ de \mathbb{R}^3 dans \mathbb{R}^3 caractérisée par : $\tau_A(\theta(X)) = \theta(\rho(X))$ et prouver que ρ est un automorphisme orthogonal de \mathbb{R}^3 .

IV.B.3) Soit U un vecteur non nul fixé de \mathbb{R}^3 et $A = \theta(U)$. On considère $\sigma = -\tau_A$. Montrer que l'application linéaire qui est associée à σ par la question précédente est la symétrie orthogonale par rapport au plan orthogonal à U .

••• FIN •••
