

# BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

## MATHÉMATIQUES

Série S

Enseignement Obligatoire

Durée de l'épreuve : 4 heures – Coefficient : 7

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.

Du papier millimétré est mis à la disposition des candidats.

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

***Le candidat doit traiter les quatre exercices. Il est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.***

***La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.***

## Exercice 1 (5 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  ;  
unité graphique : 4cm.

On considère le point A d'affixe  $z_A = 2 + i$  et le cercle  $(\Gamma)$  de centre A et de rayon  $\sqrt{2}$ .

1. Faire une figure qui sera complétée tout au long de l'exercice.
2. a) Déterminer les affixes des points d'intersection de  $(\Gamma)$  et de l'axe  $(O; \vec{u})$ .  
b) On désigne par B et C les points d'affixes respectives  $z_B = 1$  et  $z_C = 3$ .  
Déterminer l'affixe  $z_D$  du point D diamétralement opposé au point B sur le cercle  $(\Gamma)$ .
3. Soit M le point d'affixe  $\frac{3}{5} + \frac{6}{5}i$ .
  - a) Calculer le nombre complexe  $\frac{z_D - z_M}{z_B - z_M}$ .
  - b) Interpréter géométriquement un argument du nombre  $\frac{z_D - z_M}{z_B - z_M}$  ; en déduire que le point M appartient au cercle  $(\Gamma)$ .
4. On note  $(\Gamma')$  le cercle de diamètre [AB].  
La droite (BM) recoupe le cercle  $(\Gamma')$  en un point N.
  - a) Montrer que les droites (DM) et (AN) sont parallèles.
  - b) Déterminer l'affixe du point N.
5. On désigne par M' l'image du point M par la rotation de centre B et d'angle  $-\frac{\pi}{2}$ .
  - a) Déterminer l'affixe du point M'.
  - b) Montrer que le point M' appartient au cercle  $(\Gamma')$ .

## Exercice 2 (5 points)

### Partie A

On considère deux points A et D de l'espace et on désigne par I le milieu du segment [AD].

1. Démontrer que, pour tout point M de l'espace,  $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MA} = MI^2 - IA^2$ .
2. En déduire l'ensemble (E) des points M de l'espace tels que  $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MA} = 0$ .

### Partie B

Dans l'espace rapporté au repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , les points A, B, C et D ont pour coordonnées respectives A(3 ; 0 ; 0), B(0 ; 6 ; 0), C(0 ; 0 ; 4) et D(-5 ; 0 ; 1).

1. a) Vérifier que le vecteur  $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  est normal au plan (ABC).  
b) Déterminer une équation du plan (ABC).
2. a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite  $\Delta$ , orthogonale au plan (ABC) passant par D.  
b) En déduire les coordonnées du point H, projeté orthogonal de D sur le plan (ABC).  
c) Calculer la distance du point D au plan (ABC).  
d) Démontrer que le point H appartient à l'ensemble (E) défini dans la partie A.

### Exercice 3 (6 points)

Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $]1 ; +\infty[$  par  $f(x) = \ln x - \frac{1}{\ln x}$ .

On nomme (C) la courbe représentative de  $f$  et  $\Gamma$  la courbe d'équation  $y = \ln x$  dans un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Étudier les variations de la fonction  $f$  et préciser les limites en 1 et en  $+\infty$ .
2. a) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \ln x]$ . Interpréter graphiquement cette limite.  
b) Préciser les positions relatives de (C) et de  $\Gamma$ .
3. On se propose de chercher les tangentes à la courbe (C) passant par le point O.  
a) Soit  $a$  un réel appartenant à l'intervalle  $]1 ; +\infty[$ .  
Démontrer que la tangente  $T_a$  à (C) au point d'abscisse  $a$  passe par l'origine du repère si et seulement si  $f(a) - a f'(a) = 0$ .

Soit  $g$  la fonction définie sur l'intervalle  $]1 ; +\infty[$  par  $g(x) = f(x) - x f'(x)$ .

- b) Montrer que sur  $]1 ; +\infty[$ , les équations  $g(x) = 0$  et  $(\ln x)^3 - (\ln x)^2 - \ln x - 1 = 0$  ont les mêmes solutions.
  - c) Après avoir étudié les variations de la fonction  $u$  définie sur  $\mathbf{R}$  par  $u(t) = t^3 - t^2 - t - 1$ , montrer que la fonction  $u$  s'annule une fois et une seule sur  $\mathbf{R}$ .
  - d) En déduire l'existence d'une tangente unique à la courbe (C) passant par le point O.  
La courbe (C) et la courbe  $\Gamma$  sont données en annexe, page 6.  
Tracer cette tangente le plus précisément possible sur cette figure.
4. On considère un réel  $m$  et l'équation  $f(x) = mx$  d'inconnue  $x$ .  
**Par lecture graphique** et sans justification, donner, suivant les valeurs du réel  $m$ , le nombre de solutions de cette équation appartenant à l'intervalle  $]1 ; 10]$ .

### Exercice 4 (4 points)

On considère les suites  $(x_n)$  et  $(y_n)$  définies pour tout entier naturel  $n$  non nul par :

$$x_n = \int_0^1 t^n \cos t \, dt \quad \text{et} \quad y_n = \int_0^1 t^n \sin t \, dt.$$

1.
  - a) Montrer que la suite  $(x_n)$  est à termes positifs.
  - b) Étudier les variations de la suite  $(x_n)$ .
  - c) Que peut-on en déduire quant à la convergence de la suite  $(x_n)$  ?
  
2.
  - a) Démontrer que, pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $x_n \leq \frac{1}{n+1}$ .
  - b) En déduire la limite de la suite  $(x_n)$ .
  
3.
  - a) À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que, pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $x_{n+1} = -(n+1)y_n + \sin(1)$ .
  - b) En déduire que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$ .
  
4. On admet que, pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $y_{n+1} = (n+1)x_n - \cos(1)$ .

Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n x_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n y_n$ .

## Annexe

*Cette page est à compléter et à remettre avec la copie à la fin de l'épreuve*

### EXERCICE 3

Représentations graphiques obtenues à l'aide d'un tableur.

Légende :

— courbe  $\Gamma$  représentative de la fonction  $\ln$

--- courbe (C) représentative de la fonction  $f$

