

EPREUVE SPECIFIQUE – FILIERE MP

 MATHEMATIQUES 2

Durée : 4 heures

Les calculatrices sont interdites.

* * *

NB : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.

Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RACINES CARRÉES DE MATRICES

Notations

Dans ce sujet, n est un entier naturel non nul et on note :

$M_n(\mathbb{R})$ la \mathbb{R} - algèbre des matrices carrées réelles de taille n .

$M_{n,1}(\mathbb{R})$ le \mathbb{R} - espace vectoriel des matrices à n lignes et une colonne.

$GL_n(\mathbb{R})$ le groupe des matrices inversibles de $M_n(\mathbb{R})$.

I_n la matrice unité de $M_n(\mathbb{R})$.

Id l'application identité de \mathbb{R}^n .

Pour une matrice A de $M_n(\mathbb{R})$, tA est sa matrice transposée.

$S_n(\mathbb{R})$ le sous-espace vectoriel des matrices symétriques de $M_n(\mathbb{R})$.

$S_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives de $M_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire des matrices A de $S_n(\mathbb{R})$ vérifiant : pour toute matrice $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$, ${}^tXAX \geq 0$.

Si x_1, x_2, \dots, x_n sont des réels, on note $\text{diag}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ la matrice diagonale de $M_n(\mathbb{R})$ qui admet pour coefficients diagonaux les réels x_1, x_2, \dots, x_n dans cet ordre.

Si p est un entier naturel non nul, on notera $\|\cdot\|_\infty$ la norme infinie sur \mathbb{R}^p :

si $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$, $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq p} |x_i|$.

Si $a \in \mathbb{R}^p$ et $r > 0$, on note $B_\infty(a, r)$ la boule ouverte de centre a et de rayon r pour la norme $\|\cdot\|_\infty$.

Tournez la page S.V.P.

Objectifs

Soit A une matrice de $M_n(\mathbb{R})$, on dit qu'une matrice R de $M_n(\mathbb{R})$ est une racine carrée de A si $R^2 = A$.

On note $\text{Rac}(A)$ l'ensemble des racines carrées de A , c'est-à-dire

$$\text{Rac}(A) = \{R \in M_n(\mathbb{R}), R^2 = A\}.$$

Le problème propose de déterminer les racines carrées de A dans différents exemples, (on pourra constater qu'une matrice peut admettre parfois une infinité de racines) et d'étudier quelques propriétés topologiques de $\text{Rac}(A)$.

Les trois parties du problème sont **indépendantes**.

Les trois premiers exemples de la partie I sont tous **indépendants**.

I – DÉTERMINATION DE $\text{Rac}(A)$ DANS QUELQUES EXEMPLES

Exemple 1 : Cas où A possède n valeurs propres distinctes

On suppose que la matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ admet n valeurs propres réelles $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$.

1. Justifier l'existence d'une matrice $P \in M_n(\mathbb{R})$ inversible telle que $A = PDP^{-1}$ où $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, puis montrer que R est une racine carrée de A , si et seulement si la matrice $S = P^{-1}RP$ est une racine carrée de D .
2. Racines carrées de D
Soit S une racine carrée de D .
 - a. Montrer que $DS = SD$.
 - b. En déduire que la matrice S est diagonale.
 - c. On note alors $S = \text{diag}(s_1, s_2, \dots, s_n)$. Que vaut s_i^2 lorsque $i \in \{1, \dots, n\}$?
 - d. Que peut-on dire de $\text{Rac}(A)$ si A admet une valeur propre strictement négative?
 - e. Si on suppose que toutes les valeurs propres de A sont positives ou nulles, déterminer les racines carrées de la matrice D . On pourra poser $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$ pour $i \in \{1, \dots, n\}$.
3. Écrire toutes les racines carrées de A à l'aide de la matrice P . Combien de racines carrées A admet-elle? (On discutera selon le signe des valeurs propres de A).
4. Application :

Écrire les racines carrées de $A = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$ à l'aide de la matrice P que l'on déterminera.

Exemple 2 : Cas où A est la matrice nulle de $M_n(\mathbb{R})$

Dans cet exemple, on cherche à déterminer les racines carrées de la matrice nulle.

Soit $R \in M_n(\mathbb{R})$, une racine carrée de la matrice nulle.

5. Soit f l'endomorphisme de \mathbb{R}^n dont R est la matrice dans la base canonique de \mathbb{R}^n . On note r le rang de f .
 - a. Comparer $\text{Im } f$ et $\text{Ker } f$ puis montrer que $r \leq \frac{n}{2}$.
 - b. On suppose f non nul, donc $r \geq 1$. Soit (e_1, \dots, e_r) une base de $\text{Im } f$ que l'on complète avec $(e_{r+1}, \dots, e_{n-r})$ pour former une base de $\text{Ker } f$. Pour $i \in \{1, \dots, r\}$, on note u_i le vecteur tel que $f(u_i) = e_i$.
Montrer que la famille $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_{n-r}, u_1, \dots, u_r)$ est une base de \mathbb{R}^n puis écrire la matrice de f dans la base \mathcal{B} . On notera M_r cette matrice.
6.
 - a. Déterminer les racines carrées dans $M_n(\mathbb{R})$ de la matrice nulle.
 - b. Application : déterminer dans $M_4(\mathbb{R})$, les racines carrées de la matrice nulle.

Exemple 3 : Cas où $A = I_n$

7. Soit R une racine carrée de l'unité I_n .
 - a. Vérifier que R est une matrice inversible.
 - b. Montrer que R est semblable à une matrice diagonale que l'on décrira.
8. Déterminer $\text{Rac}(I_n)$. On pourra poser $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$ pour $i \in \{1, \dots, n\}$.

Exemple 4 : Cas où A est une matrice symétrique réelle

Dans cet exemple, toutes les matrices que l'on considérera appartiennent à $M_n(\mathbb{R})$.

9. Une matrice symétrique admet-elle nécessairement une racine carrée ?
10. Montrer qu'une matrice symétrique positive admet au moins une racine carrée qui est elle-même symétrique et positive.

Remarque : On peut montrer l'unicité de cette racine carrée dans $S_n^+(\mathbb{R})$ mais ce ne sera pas utile pour la suite du problème.

II – ÉTUDE TOPOLOGIQUE DE $\text{Rac}(A)$

Si A est une matrice de $M_n(\mathbb{R})$ qui a pour coefficients $(a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$, on définit une norme en posant $N(A) = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{i,j}|$. On munit $M_n(\mathbb{R})$ de cette norme N .

Tournez la page S.V.P.

11. Fermeture de $\text{Rac}(A)$

Soit A une matrice de $M_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\text{Rac}(A)$ est une partie fermée de $M_n(\mathbb{R})$.

12. Étude du caractère borné de $\text{Rac}(I_n)$ **a. Un exemple instructif**

Pour tout entier naturel q , on pose $S_q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ q & -1 \end{pmatrix}$. Calculer S_q^2 . $\text{Rac}(I_2)$ est-elle une partie bornée de $M_2(\mathbb{R})$?

b. $\text{Rac}(I_n)$ est-elle une partie bornée de $M_n(\mathbb{R})$ pour $n \geq 3$?**c. Application : pour cette question, $n \geq 2$.**

Montrer qu'il n'existe pas de norme $\| \cdot \|$ « surmultiplicative » sur $GL_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire vérifiant pour tous A et B dans $GL_n(\mathbb{R})$, $\|AB\| \geq \|A\| \|B\|$.

III – ZÉROS DE FONCTIONS POLYNOMIALES. APPLICATION À LA DÉTERMINATION DE L'INTÉRIEUR DE $\text{Rac}(A)$

Soit p un entier naturel non nul. On munit \mathbb{R}^p de la norme infinie $\| \cdot \|_\infty$.

On note Γ_p l'ensemble des **fonctions polynomiales** sur \mathbb{R}^p , c'est-à-dire :

si $P \in \Gamma_p$, il existe N un entier naturel et une famille de réels $\{a_{i_1, \dots, i_p}, 1 \leq i_1, \dots, i_p \leq N\}$ tels que

$$\forall (x_1, x_2, \dots, x_p) \in I_1 \times \dots \times I_p, \quad P(x_1, x_2, \dots, x_p) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_p \leq N} a_{i_1, \dots, i_p} x_1^{i_1} \dots x_p^{i_p}.$$

Par exemple si $p = 3$, $P(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 3x_1x_2x_3 + 4x_2^5$ est une fonction polynomiale sur \mathbb{R}^3 .

Si $p = 1$, Γ_1 est l'ensemble des fonctions polynômes sur \mathbb{R} .

Enfin, si $P \in \Gamma_p$, on pose $Z(P) = \{(x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p, P(x_1, x_2, \dots, x_p) = 0\}$ ($Z(P)$ est l'**ensemble des zéros de la fonction polynomiale P**).

L'objectif de cette partie est d'étudier l'intérieur de $Z(P)$, afin de déterminer l'intérieur de $\text{Rac}(A)$.

On rappelle que si Ω est une partie de \mathbb{R}^p , un vecteur a de \mathbb{R}^p est un point intérieur à Ω s'il existe un nombre réel r strictement positif tel que $B_\infty(a, r) \subset \Omega$ et que l'intérieur d'une partie est l'ensemble de ses points intérieurs.

13. Questions préliminaires :

- a. Soit $a = (a_1, \dots, a_p) \in \mathbb{R}^p$ et $r > 0$. Montrer que $B_\infty(a, r)$ peut s'écrire comme produit de p intervalles.
- b. Soient F et G deux parties de \mathbb{R}^p . On suppose que F et G sont d'intérieur vide, montrer que $F \cap G$ est encore d'intérieur vide.

14. Exemples d'ensemble des zéros de fonctions polynomiales

- a. Dans cette question $p = 1$. Soit P une fonction polynôme sur \mathbb{R} . Dans quel cas $Z(P)$ est-il infini ? Justifier votre réponse.
- b. Dans cette question $p = 2$. On considère $P(x_1, x_2) = 2x_1 - x_2 - 1$ et $Q(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2$. Représenter graphiquement dans le plan \mathbb{R}^2 les ensembles $Z(P)$ et $Z(Q)$.
 $Z(P)$ et $Z(Q)$ sont-ils infinis ?

15. Intérieur de l'ensemble des zéros d'une fonction polynomiale

Soit $P \in \Gamma_p$.

- a. Soient I_1, I_2, \dots, I_p des parties infinies de \mathbb{R} . Montrer par récurrence que si la fonction polynomiale P s'annule sur $I_1 \times I_2 \times \dots \times I_p$, alors P est la fonction nulle.
- b. En déduire que si P s'annule sur une partie d'intérieur non vide, P est la fonction nulle.
- c. Si l'on suppose que P n'est pas la fonction nulle, que vaut l'intérieur de $Z(P)$?

16. Application à l'étude de l'intérieur de $\text{Rac}(A)$

Dans cette question, on confondra les espaces vectoriels $M_n(\mathbb{R})$ et \mathbb{R}^{n^2} . Par exemple, on prendra la liberté d'écrire que pour $M \in M_n(\mathbb{R})$, $M = (m_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathbb{R}^{n^2}$, sans se soucier de l'ordre des termes.

Soit A une matrice de $M_n(\mathbb{R})$.

- a. Écrire $\text{Rac}(A)$ sous forme d'un sous-ensemble de \mathbb{R}^{n^2} puis montrer qu'il existe des éléments P_1, P_2, \dots, P_{n^2} de Γ_{n^2} tels que $\text{Rac}(A) = \bigcap_{l=1}^{n^2} Z(P_l)$.
- b. Déterminer l'intérieur de $\text{Rac}(A)$.

Fin de l'énoncé

Tournez la page S.V.P.